

てんかん治療薬・双極性障害治療薬 「ラミクタール[®]錠」 を服用される患者様とご家族の皆様へ

ラミクタール錠の服用中に、重篤な皮膚障害（広範囲にわたり赤くなり、やけどのような水ぶくれ、皮膚のはがれ、ただれなどが全身に広がる）があらわれることがあります。副作用が疑われた場合には早期に適切な治療を受けてください。

- 下記のような症状があらわれた場合には、すぐに医師・薬剤師に相談してください
 - 発疹 ○発熱（38 度以上）
 - 唇や口内のただれ ○目の充血
 - のどの痛み ○体がだるい
 - リンパ節（首、わきの下、股の付け根など）のはれ など
- 医師や薬剤師に相談する際は、ラミクタール錠を服用していることを伝えてください
- 医師からラミクタール錠の服用を中止するよう指示された場合は、すぐに中止してください

ラミクタール錠に関する患者の皆様やご家族の皆様向けとして「患者向医薬品ガイド」が下記に掲載されております

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構「医薬品医療機器総合機構ホームページ」

URL: <http://www.info.pmda.go.jp/>

患者向医薬品ガイド(http://www.info.pmda.go.jp/guide_ippan/guide.html)

【お問い合わせ先】

グラクソ・スミスクライン株式会社 カスタマー・ケア・センター
フリーダイヤル:0120-563-607

- 2015 年 2 月 4 日～2 月 13 日の受付時間：平日 9：00～18：00／土日祝日 9：00～17：00
- 上記以外の受付時間：9:00～18:00（土日祝日および当社休業日を除く）

FAX: 0120-561-047（24 時間受付）